

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 5 TA 2015/2016

13711081 - KIKI FARADINA ARDIYANTI

| STATION | FEEDBACK |
|------------------------|---|
| ANC | anamnesis oke - pemeriksaan fisik oke - pemeriksaan penunjang yang tepat belum disampaikan - menulis resep sebaiknya di blanko resep bukan di kertas RM |
| IMPLANT | perfect!! |
| IMUNISASI | prosedur penyuntikan : yang dikerjakan vaksin polio, namun yg diminta rubrik ujian adalah BCG. Edukasinya baik untuk polionya, tanggal kembalinya sudah benar, tp kl edukasi BCG nanti dijelaskan efek bintil jangan disenggol dan ditekan, kemudian jika timbul nanah jangan diberi antibiotik dan akan timbul jaringan parut. |
| IPM 2 (PEDIATRIK 1) | riw.trauma kepala (-), epilepsi (-), hanya mengenai keluhan serupa. px kernig, vital sign lupa tidak dilakukan utk suhu, respi, nadi. Dx: meningitis, DD: (-), terapi pendahuluan hanya modok utk observasi, obatnya hanya paracetamol, edukasi bad news belum tersampaikan. waktu masih tersisa banyak. |
| IPM 3 (PEDIATRIK 2) | kurang menggali tentang perjalanan kemunculan ruam dan penyebaran ruam, edukasi kurang lengkap seperti jaga kebersihan-jangan tukeran handuk/pakaian/alat makan dgn orang lain, dosis asiklovir salah-baca lagi ya |
| IPM 4 (KASUS SENSITIF) | diagnosis banding krg tepat. slebihnya sdh ok |
| IPN 1 (GYN) | toilet vulva cukup pakai kassa dan air/nacl saja, sediaan obat kurang tepat |
| KONSELING KB | anamnesis tidak menggali FR lain terkait pemasangan KB, hanya riwayat kehamilan dan paritas sebelumnya saja. kalau bersin ataupun banyak bergerak IUD bisa keluar??. untuk alt2 KB yang lain penjelasan kurang lengkap-->terkait isi, dan hal-hal yang perlu diketahui oleh pasien. pasien datang untuk konsul dan ingin KB, dan telah memilih IUD, mengapa kamu tidak menganjurkan ataupun menjelaskan kapan bisa memakainya?? |
| PPN | cuci tangan dulu sebelum menyiapkan alat. oksitosin jangan ditaruh di troli steril. sebaiknya handscrub sebelum pakai sarung tgn utk mulai pimpin persalinan. melahirkan bahu seharusnya arahkan kepala ke bawah sampai bahu anterior tampak. kemudian arahkan kepala ke atas utk melahirkan bahu posterior. menegecek ada tdknya bayi kedua harusnya sbml inj oksitosin. kala 3 masase uterus segera setelah plasenta lahir. |
| RESUSITASI NEONATUS | diagnosis salah, perhatikan ritme, lepas-lepas tekan.. |
| SIRKUMSISI | persiapan dah ok, teknis circumsisi sebenarnya dah benar hanya terlihat kurang rapi dan saat bekerja terkesan kurang tenang |