

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 7 TA 2016/2017**

13711061 - GHANIY PRIMA SANDI

STATION	FEEDBACK
IPM3	baik
IPM5	sudah informed consent tapi ucapannya kurang jelas, seperti menggumam. ayo buka mulut lebih lebar dan sedikit dikeraskan suaranya ya. sudah menyiapkan alat. sudah menghentikan perdarahan. sudah cuci tangan WHO. sudah desinfeksi luka tapi handscoon nyenggol selimut non steril--> singkirkan jauh2 selimutnya. pasang duk sebelum anestesi. sudah anestesi tapi belum aspirasi. teknik anestesi sebaiknya tangan kiri membantu memfiksasi dan meregangkan kulit, bukan memegang spuit dua2nya. debridemen dengan Nacl dan menghilangkan jaringan nekrotik. duk jadi basah karena sudah dipasang. jahitan pertama benang putus, kedua kurang rapat dan tidak kencang simpulnya, ketiga kurang rapat. waktu habis belum selesai, belum ditutup lukanya, belum px penunjang, belum edukasi
IPM6	harusnya kamu menanyakan riwayat sebelum keluhan itu ( trauma kepala, kejang, stroke, DM), riwayat perkembangan awal, riwayat kepribadian sebelum sakit?; kenapa banyak blocking ya? seperti kamu tidak tahu apa yang mau kamu tanyakan; banyak aspek pemeriksaan status psikiatrik yang tidak kamu nilai, (bentuk pikir, isi pikir/waham yang menonjol, progresi pikir insight, orientasi orang/tempat/waktu/ gangguan persepsi (halusinasi apa?, perhatian, hubungan jiwa, dll) pelajari cara menggalinya. diagnosis banding tidak ada yg benar. terapi hanya 1 yang benar, edukasi itu juga memuat, apa yg terjadi pada pasiennya.
IPM7	Anamnesis harus menanyakan perjalanan penyakit ya, maksudnya apakah keluhan penyertanya muncul duluan atau bagaimana.. Ax harus lebih diperdalam untuk masalah kebiasaan.. pemeriksaan fisik kurang periksa keadaan otot gastrocnemius... diagnosis disebutkan ya leptospirosis dengan komplikasi atau tidak.. drug of choice antibiotik untuk kasus ini apa? bukan cipro ya.. asmef juga bukan antipiretik jadi tidak efektif pada kasus ini.....
IPM8	Rontgen Thorax : tidak hanya sekedar cardiomegali tapi juga harus mengerti bagaimana cara menghitung CTR (cardio Thorax Ratio). hanya frekuensi pemakaian furosemide yang kurang tepat sebaiknya 1 dd 1 cukup.