

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 5 TA 2017/2018

15711160 - BRAIN NOVI ANDRI

STATION	FEEDBACK
ANC	px penunjangnya jangan cuma darah rutin tambahkan USG dan atau urin rutin jika diperlukan/blm pernah. edukasinya lebih pada ketaatan minum tablet fe nya ya, bukan dilanjutkan/diberinya.
IPM 2	Px Fisik : Braiiin, informed consentnya gmna? td hanya mengatakan : baik ibu, saya periksa adekny dulu ya buk silahkan dibaringkan adeknya, ibu yang tenang yaa.. --> lakukan informed consent yang baik yaa.. jelaskan dengan seperlunya mau melakukan px apa, risiko px nya apa?, prosedur singkat saja gmna, kemudian diakhiri dengan pernyataan oral setuju atau tdk setuju. --> bs dilakukan dengan cepat kok. Dx : meningoensefalitis. DD : meningitis, ensefalitis, KD. 4 talak : oksigenasi, antipiretik, antiinflamasi, observasi 24 jam, rujuk. --> terapi kausatifnya apa?? kok dibilangnya dikasi supportif aja? br keinghet di akhirnya butuh antibiotik.
IPM 4	paham gak dek yg dimaksud dg mood jelek...drpd salah kan hrsnya digali lbh jauh misal ditanyakan apakah mudah tersinggung/iritable, gelisah, cemas, depresikah, capek terus kah?dsbnya. nah jika itutergali kan itu bg dr gejala penyerta dr suatu ggn misal dlm hal ini adalah putus obat opioid.riwayat pengobatan juga blm ditanyakan.kmd juga gejala fisik yg bs timbul spt piloereksi, diare, demam, dsbnya juga hrs digali, adanya hendaya juga blm tergali.px fisik spt rinorhea, pupil juga blm diusulkan, diagnosis salah, dd/withdrawal amfetamin dan intoksikasi opioid,
RESUSITASI NEONATUS	cara cuci tangan WHO nya terbalik tuh langkahnya. untuk persiapan alat pas buat shoulder roll terlalu lebar, kemudian alasnya jangan terlalu banyak, nanti kalau butuh kompresi kan harusnya alasnya keras, bukan selembut itu. jangan lupa dinyalakan lampunya saat persiapan, biar hangat tempatnya dulu. cara basic step itu dimulai dari posisi, suction, rangsang sekaligus buang handuk basah. cara memegang sungkup kurang tepat itu, belajar lagi. ritmenya sudah ok. ketika mulai kompresi harusnya pasang reservoir ya. untuk penilaian apakah bisa tapering off bukan patokan menangis ya tapi bernafas spontan karena kadang bayi pasca resusitasi itu masih belum kuat menangis tapi bernafas ok. apa yang dievaluasi di perawatan pasca resusitasi? untuk menilai HR cukup pakai palpasi umbilicus. cara kompresi kurang tegak lurus jempolnya.