

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 5 TA 2017/2018

15711169 - DIRGA ASNA CERIA

STATION	FEEDBACK
ANC	terlalu lama di anamnesis, tidak melakukan pemeriksaan vital sign, tidak melakukan pemeriksaan obstetri dengan benar, tidak menegakkan diagnosis, edukasi terlalu singkat dan terburu-buru.
IMUNISASI	ANAMNESIS:ok sudah baik; IMUNISASI:ok; PROSEDUR:cuci tangan WHO nya harus 6 gerakan ya, jangan hanya 4 gerakan; pelarutnya 4cc tp hanya mengambil 1x dg spuit 3cc, kan semua pelarut harus digunakan; kenapa harus ganti jarum? jarum kan tidak menembus karet vial, jd tdk akan tumpul; saat injeksi, memasukkan jarum terlalu dalam dan menyuntikkan kurang cepat, sehingga tidak mengembang; cara memegang spuit saat menginjeksi jg kurang tepat; EDUKASI: sudah cukup baik, tp jadwal selanjutnya untuk hepB bukan polio
IMUNISASI	ANAMNESIS:ok sudah baik; IMUNISASI:ok; PROSEDUR:cuci tangan WHO nya harus 6 gerakan ya, jangan hanya 4 gerakan; pelarutnya 4cc tp hanya mengambil 1x dg spuit 3cc, kan semua pelarut harus digunakan; kenapa harus ganti jarum? jarum kan tidak menembus karet vial, jd tdk akan tumpul; saat injeksi, memasukkan jarum terlalu dalam dan menyuntikkan kurang cepat, sehingga tidak mengembang; cara memegang spuit saat menginjeksi jg kurang tepat; EDUKASI: sudah cukup baik, tp jadwal selanjutnya untuk hepB bukan polio
IPM 2	px fisik cukup baik, runtut dan lengkap. dx ok, tx cukup, tapi profilaksis kejang bisa dipilih phenitoin atau phenobarbital IV line. antipiretik paracetamol supp. ok good luck Dirga!!
IPM 3	anamnesis cukup lengkap, px. fisik : td periksa bibir kering??dx benar, pilihan obat benar, tapi apakah zinc 3 x sehari??resep oralit belum lengkap No.??edukasi pencegahan, dirujuk kapan??
PPN	DIAGNOSIS: Oke. KALA 2: Cuci tangan tidak sesuai 6 step WHO. Lain2nya oke. KALA 3: Oke.
PPN	DIAGNOSIS: Oke. KALA 2: Cuci tangan tidak sesuai 6 step WHO. Lain2nya oke. KALA 3: Oke.
SIRKUMSISI	menggunakan sarung tangan diperhatikan lagi prinsip sterilitasnya, tangan jangan menyentuh bagian sarung tangan steril. pemilihan sarung tangan terlalu besar, beresiko tergantung, terjepit dan mengganggu melakukan tindakan dengan baik. pemilihan dosis antibiotik yang kurang tepat. ">3 months and <40 kg: 25 mg/kg/day PO divided q12hr or 20 mg/kg/day PO divided q8hr"