

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 4 AGUSTUS 2018 TA 2017/2018

16711042 - TRI SURYA NINGSIH

STATION	FEEDBACK
KOMUNIKASI	sudah cukup bail
PERAWATAN LUKA	<p>tujuan menggunakan sarung tangan bersih adalah untuk melindungi tri dari kontaminasi darah. jadi kamu gunakan sarung tangan bersih di awal tujuannya untuk pemeriksaan luka, seperti inspeksi, palpasi dan cek move. kemudian bersihkan luka seperlunya dan kontrol perdarahan. setelah itu lepas sarung tangan bersih (karena sudah terkontaminasi darah pasien). dan siapkan alat untuk penjahitan. kan kamu nyiapin alat pake korintang (bagian bawah korintang itu steril ya dek), jadi pakai korintang saja tidak apa-apa. Yang dilakukan tri hanya terbaik saja secara prinsip. Debridemen (membersihkan luka sampai bagian dalam) dilakukan setelah anestesi ya tri, kalau belum di anestesi pasien bisa kesakitan. Ampul lidokain itu bukan barang steril, jangan dipegang dengan tangan (yg sudah memakai handscoon steril), jadi ON. bisa kamu patahkan di awal saat memasukkan ke spuit ampulnya ga usah dipegang itu bisa kok dek. Spuit yang digunakan bukan spuit 1 cc ya untuk anestesi karena lidokain isinya 2ml kalo spuit yang kamu pake cuma 1ml, jadi kalo kurang bisa 2 kali ambil lidokain ga nyaman karena pasien jadi ditusuk berkali-kali. Gunting yang kamu gunakan saat menggunting benang itu adalah gunting perban ya dek, gunting perban itu tidak steril, jadi lebih diperhatikan lagi alat yang digunakan. jahitan masih longgar, waktu habis tidak sempat menutup luka dan edukasi.</p>