

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 4 AGUSTUS 2018 TA 2017/2018**

16711107 - MUCHAMAD MARWAN

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
BACA RESEP INFO OBAT	persiapan obat: kurang menghangatkan obatnya dulu persiapan pasien: cuci tangannya stlh menggunakan juga menjelaskan cara: selain dimiringkan diminta menarik daun telinga kebeleakang, tragus ditekan saat obat masuk, bersihkan kalau ada cairan keluar, bersihkan ujung wadah stlh digunakan. edukasi: edukasinya ttg efek samping nya apa? trs minta pasien mengulangi. mgkn lbh runtut lagi ya mas menjelaskannya
BALUT BIDAI	Pakai APD dek, kamu membersihkan luka terbuka lo.. risiko transmisi penyakit via kontak. Perawatan luka bisa ditutup kasa, tapi untuk membantu menekan bila masih ada risiko perdarahan bisa ditambah dengan pembalutan (baca instruksinya baik-baik, ada perintah untuk pembalutan). Px ROM --> tidak hanya menggerakkan tungkai, tapi juga distalnya (pergelangan kaki & jari-jari, untuk memastikan apakah ada cedera nervus atau muskulus). Tujuan pembidaian untuk menghentikan perdarahan? dibaca lagi ya teorinya. tenang saat ujian supaya yang kamu sampaikan juga lebih runtut & ndak salah ngomong.
KOMUNIKASI	gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien dalam melakukan anamnesis. Lakukan secara sistematis
PEMASANGAN NGT	kok bngung sih dik? pekerjaan tdk sistematis. kamu mengukur panjang NGT dengan midline namun kok hasil pengukuran tsb tdk diukur kembali ke NGT dan ditandai ? (hanya diingat2). pemasangan NGT itu prinsipnya bersih dik bukan steril (kok kamu bingung?). tadi katanya 50 cm, kok kasih jel ke NGT katanya sampai 45 cm (katanya diingat2 kok yo sdh lupa)? tdk ditandai batasnya? di cek mulut interpretasi masuk lub pencernaan? tdk meminta untuk menelan? baru didorong sebentar sdh bilang sampai di batas 45 cm? (bener ini??). waktu habis. belum di fiksasi baru memasang spuit untuk mengecek udara masuk lambung atau tidak
PERAWATAN LUKA (MLBM)	menghentikan perdarahan sebaiknya diawal pemeriksaan. pemeriksaan luka sebaiknya meliputi look, feel, movement. desinfeksi dilakukan sebelum anestesi. debridement dilakukan setelah anestesi. jangan terbalik-balik. pembuatan simpul kurang simetris, buatlah dengan jarak yang sama dari tepi luka. setelah dijahit, jangan diiberikan povidone iodine lagi, cukup sufratul dan kassa steril, atau salep antibiotik bila perlu.
SWAB VAGINA - PAP SMEAR	perhatikan baik2 saat memasang duk sterilnya. diperhatikan cara pasang nya yg aman. jangan sampai tangan mengenai kaki pasiennya lagi kan sdh ON tu jdnya si handscoon.