

## FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 3 TA 2018/2019

15711093 - NASTITI WIDYA IKHSANI

STATION	FEEDBACK
IPM 2	laseque untuk pemeriksaan meningeal signs? Diagnosis Kejang demam saja? lha itu kan ada waktunya dan berulang, dengan masing2 punya durasi... rawat inap, antikonvulsan fenobarbital? dosis? ABC saat observasi... deamnya gimana de? ga perlu antipiretik?
RESUSITASI NEONATUS	handuknya dibentang ya, dalam kondisi terlipat sulit untuk mengeringkan; cara menggunakan suction kurang tepat; reposisi harus dilakukan dg benar, alas kain berada di bawah bahu bayi; reservoir dan oksigen harusnya disambungkan saat akan memulai VTP kompresi; setelah memberikan epinefrin proses VTP kompresi tetep dilanjutkan tanpa ada interupsi cek HR; dx kurang lengkap. jika sudah diresusitasi, dx menjadi post resusitasi ec asfiksia neonatorum
RESUSITASI NEONATUS (ASISTEN)	saturasi bayi biasanya dilakukan di area plantar bukan palmar; kompresi sudah baik
SIRKUMSISI	Pemilihan gunting yang digunakan kurang tepat, lakukan release preputium dengan menarik sampai sulcus glandis ya... agar smegma bisa dibersihkan. Cara melakukan insisi melingkar sebaiknya searah untuk masing2 sisi dimulai dari arah jam 12. Manajemen waktu ya...