

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 3 TA 2018/2019

16711143 - FIRDHA NURUL CHASANAH

STATION	FEEDBACK
IPM 1	Anamnesis baik. Toilet vulva untuk pengambilan sampel swab tidak perlu menggunakan povidon iodine, karena bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan. Dibaca lagi, untuk pemeriksaan apa yang perlu pakai povidon iodine? Ukuran spekulum sebaiknya disesuaikan dengan pasien. Hati-hati saat melepas spekulum supaya pasien tetap nyaman.
RESUSITASI NEONATUS	jangan dikeringkan dl sebelum hisap lendir ya, krn bisa menjadi rangsang taktil buat bayi keringkan dilakukan setelah isap lendir, yang dikerjakan sbml isap lendir itu jaga kehangatan ya (cukup dengan nyalakan lampu), tidak menanykan BB saat menyutik epinefrin, sebaiknya epinefrin disiapkan dari awal ya bukan ditengah2 resusitasi baru nyiopin,
RESUSITASI NEONATUS (ASISTEN)	oke
SIRKUMSISI	Persiapan, jika sudah dalam kondisi steril, termasuk mempersiapkan jarum dan benang ya... Agar bisa langsung dipakai. Secara umum sudah cukup baik, hanya saja perlu lebih hati - hati.