

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 5 TA 2019/2020

17711053 - MUHAMMAD ULIL ALBAB

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	next time selalu perhatikan berapa ml pelarutnya ya untuk pemilihan jenis spuit, Dosis nya untuk suntikan BCG hanya 0.05 ml ya bukan 0.5 ml. untuk jenis dan jadwal imunisasi yng disarankan untuk berikutnya blm lngkp
IPM 1	Ax: riwayat pribadi belum ditanyakan detail, pakai kondom tidak saat berhubungan? gonta ganti pasangan? alkohol? rokok?//sebaiknya kassa ditaruh di tempat steril dek agar tidak berkali-kali ambil langsung dari toples//tangan kiri di-ON-kan tapi sarung tangan kanan ikutan ON karena pegang alat2 tidak steril (plastik, kertas pH)//dek sarung tanganmu sudah ON, tidak ganti sarung tangan langsung bimanual//dx benar
PPN	sudah pake sarung tangan steril kok masih megang2 handuk bersih saat persiapan alat? kurang menyampaikan adakah indikasi episiotomi/tdk, kurang ngecek lilitan tali pusat, kurang ngecek adakah janin kedua, masasenya setelah plasenta lahir aja ya bukan sebelum plasenta lahir, kurang memperhatikan sterilitas
RESUSITASI	Bayi lahir kok yg ditanya apakah paru mengembang??? Bantalan kok di bawah perut? Cara suction salah. Bayi ditinggal persiapan pemasangan ET tanpa VTP. Saturasi bayi berapa? ET masuk maksimal ke dalam mulut. Nyuruh-nyuruh asisten tp tanganmu tidak VTP bayi, hanya menonton asisten. Masuk epinefrin kok langsung cek FJ?? HR 130 -bayi terpasang ETdg VTP kondisi tidak sianosis, kok ET dilepas begitu saja? Observasi....maksudnya???
SIRKUMSISI	sebaiknya pakai gunting yang ujungnya tumpul, agar lebih aman. jahitan jam 6 sebaiknya jangan menjahit gland penis. jahitan jam 12 kurang satu simpul (minimal 2 simpul kuat). edukasi sebaiknya meliputi menjaga luka tetap kering, minum obat teratur, perbanyak makanan bergizi dan tindakan bila ada perdarahan.