

## FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 5 TA 2019/2020

17711153 - HAALA MAHAPAWITRI

STATION	FEEDBACK
IPM 3	Tidak cuci tangan setelah PF. TTV hanya periksa suhu dan nadi. Tidak periksa abdomen.....WD dan DD kurang tepat.....oralit dicampurkan ke air berapa banyak ? dan hanya diberikan setelah BAB ? Di anamnesis Anda sudah tanya dan dapat data pasien muntah.
Konseling KB	sudah cukup baik, ditunjukkan alat peraganya dapat lebih awal ketika menjelaskan jenis KB yang lain yang disarankan seperti pil dsb.sesuai indikasi pasien, tanyakan juga riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya
RESUSITASI	Persiapan: cara merangkai laringoskop dipelajari lagi ya. tatalaksana: basic step harus lakukan suction ya. oksimetri baiknya dipasang dr awal. alas bantalan kain itu diletakkan di bawah punggung aas bukan bawah kepala. kalau memang pemasangan ET lama, pasang saja LMA dulu agar bayi tidak semakin asfiksia. dosis epinefrinnya krang, kok 0,03cc?. setelah epinefrin dimasukkan, VTP kompresi tetap dilakukan selama 1 menit, baru cek HR. Dx kurang lengkap