

FEEDBACK OSCE PREDIK PERIODE AGUSTUS 2020 TA 2020/2021

16711009 - GHEA PROVITA NAFITIANA

STATION	FEEDBACK
SISTEM GENITOURINARI	berlatih artikulasi yg jelas
SISTEM HEMATOINFEKSI	Penggalian identita kurang lengkap/ Ax lengkap// Pemeriksaan penunjang sudah baik// Diagnosis baik// Terapi antibiotika sudah tepat, lainnya baik
SISTEM INTEGUMENTUM	Dalam Anamnesis kurang menggali kebiasaan dan faktor resiko utama yang menjadi penyebab terjadinya penyakit. pemeriksaan fisik bisa ditambahkan px finger nail test setelah melihat gambaran UKK. deskripsi UKK untuk lokasi kurang tepat, anda dapat menyebutkan btk lain sesuai dengan ukuran/diameter. Diagnosa banding anda belum in line dengan pemeriksaan penunjang yg dilakukan (hanya mendapatkan informasi dr anamnesa) sehingga seharusnya anda dapat mencari alternatif lain dari diagnosa banding apabila DD tersebut dapat anda singkirkan dari pemeriksaan penunjang dan fisik yg diusulkan/diperiksa.
SISTEM KARDIOVASKULER	baik
SISTEM REPRODUKSI	Ax : sdh cukup baik. Px Fisik : oke. Px Gyn : Inspekulo saja cukup kah dek? baiknya Dx : Ab Inspien --> diperbaiki lagi diagnosisnya dek.. lengkapi lagi pemeriksaannya. ada 1 pemeriksaan fisik dan penunjang yang akan berpegaruh pd diagnosis juga. Edukasi : next, jangan ragu untuk edukasinya ya..
SISTEM RESPIRASI	Dx semua terjawab tp terbalik mestinya dg px fisik, lbh mengutamakan emfisema
SISTEM ENDOKRIN	RPS kurang digali (tdk menggali nyeri kepala & tengkuk), kebiasaan hanya ditanya makan; pem fisik hanya 3: KU, VS, sensibilitas; pem penunjang: hanya glukosa & HbA1C; Dx: DM dg neuropati, tanpa HT; Tx: tanpa terapi HT --> sdh lsg mengarah ke neuropati DM, sehingga malah byk yang terlewat tdk ditanyakan/diperiksa/minta informasi pemeriksaan
SISTEM GASTROINTESTINAL	Perfect..
SISTEM INDERA	Ax cukup, pemeriksaan cuma telinga kiri saja, lain kali pemeriksaan status lokalis THT lengkap 2 telinga, hidung dan tenggorok, penulisan resepnya diperhatikan.
SISTEM MUSKULOSKELETAL	kurang cermat, saat permintaan rontgen wrist dextra. Obat kurang sesuai, ketorolac tab 10 mg dosis tunggal (sebaiknya tetap diberikan setidaknya 1-2 hari sambil menunggu prosedur pembedahan)
SISTEM PSIKIATRI	pastikan gejala psikosisnya lebih dominan dan lbh dulu muncul drpd gangguan afeknya atau sebaliknya, agar dx tepat.
SISTEM SARAF	px neuro dasar juga harus dilakukan yaa