

FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 3.2 TA 2022/2023

20711147 - TRIANDINI

STATION	FEEDBACK
STATION IPM PEDIATRI 1	penghitungan tpm kurang tepat, yg 70 ml/kgBB kalo hanya 1 jam kurang gtepat
STATION IMUNISASI	pelarut BCG diambil dengan spuit 3 mL dan masukkan ke ampul vaksin, jangan dibalik ya....perbaiki cara mu berkomunikasi, penjelasan mengenai vaksin itu harusnya di awal saat informed consent.
STATION IPM PEDIATRIC 2	PX. Fisik: kurang lengkap ya, jangan lupa cek kesadaran pasien, agar tatalaksananya tepat ya. Diagnosisnya belum benar, kok diagnosis bandingnya malah menjadi diagnosis kerja? lebih teliti lagi ya. Diagnosis bandingnya juga yang itu belum benar ya. Tatalaksana sudah menyampaikan rawat inap, tapi tatalaksana lain terkait dengan terapi pada kasus ini belum disampaikan, seharusnya obat anti kejangnya apa yang harus diberikan? lebih teliti lagi ya dek. Edukasi: kurang lengkap ya dek, seharusnya pada kasus seperti ini, ada banyak hal yang harus disampaikan ke orangtua, misal pemeriksaan lanjutannya apa, kemudian tatalaksana yang harus dilakukan, apakah pasien ini mau dirawat sendiri atau perlu dirujuk, itu seharusnya bisa tersampaikan saat edukasi. lebih teliti dan hati hati lagi ya dek.
STATION RESUSITASI NEONATUS	Cara kompresi benar. Tidak memasang oksimetri. VTP inisiasi kok 30 detik? Tidak evaluasi post pemasangan ET, simetrisitas. Alur resusitasi SALAH. Setelah HR > 100 apa yang dievaluasi? Kok ET dilepas??
STATION RESUSITASI NEONATUS	Cara kompresi benar. Tidak memasang oksimetri. VTP inisiasi kok 30 detik? Tidak evaluasi post pemasangan ET, simetrisitas. Alur resusitasi SALAH. Setelah HR > 100 apa yang dievaluasi? Kok ET dilepas??
STATION SIRKUMSISI	lakukan tindakan dengan menjaga teknik aseptik, jangan memegang daerah non steril setelah pakai serung tangan, lakukan desinfeksi dengan benar, instrumen jangan sampai melewati batas kain doek, pergunkan needle holder utk mengambil jarum jahit dari tempatnya