

FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 3.2 TA 2022/2023

20711200 - MAYLAFF BEBY ANNISA NURUL ZAHRA

STATION	FEEDBACK
STATION IPM PEDIATRI 1	Secara umum sudah baik; PF yang diusulkan sudah tepat, namun dipelajari lagi teknik pemeriksaan fisik thoraks dan abdomen ya; Untuk tatalaksana oralit tepat, untuk zink tepat, pemilihan antibiotik kurang tepat; Pasien demam jadi perlu diberikan paracetamol ya.
STATION IMUNISASI	Pilihan vaksin dan tujuannya tepat (indikasi sudah dijelaskan dan kontraindikasi sudah ditanyakan)//Th nonfarmako: belum mengecek vaksin masih bagus atau tidak, mengganti jarum suntik namun ukurannya tidak tepat, dan sudah menuliskan di KMS//Edukasi: tindakan paska imunisasi, jadwal dan jenis pemberian imunisasi selanjutnya sudah diedukasikan
STATION IPM PEDIATRIC 2	KU TTV sudah baik. mahasiswa menggunakan senter mengecek faring namun belum mengecek laring ataupun tonsil. px neurologis baik. bantal bs disingkirkan saja. dx disebutkan KDK dengan dd KDS dan status epileptikus, belum menyebutkan dx dari keadaan faring hiperemisnya. diakhir baru menambahkan tonsilitis. Sudah baik dik. terapi baik., lebih empati dan tersenyum lagi ke pasien ya dik. semangat.
STATION RESUSITASI NEONATUS	urutannya isap lendir dulu baru keringkan dan rangsang taktil. sebelum SRIBTA cek apakah dada mengembang saat VTP awal. VTP menekan ambubag jangan terlalu dalam. perhatikan juga irama VTP, jsngsn terlalu cepat. saat kompresi hubungkan ambubag dg oksigen beneran jangan cuma diomongkan.
STATION RESUSITASI NEONATUS	urutannya isap lendir dulu baru keringkan dan rangsang taktil. sebelum SRIBTA cek apakah dada mengembang saat VTP awal. VTP menekan ambubag jangan terlalu dalam. perhatikan juga irama VTP, jsngsn terlalu cepat. saat kompresi hubungkan ambubag dg oksigen beneran jangan cuma diomongkan.
STATION SIRKUMSISI	teknis anestesi kurang tepat, perlu dilatih lagi, cara ngecek nyeri jangan menggunakan tangan karena sensainya hanya taktil, irisan jam 12 kurang tdk sampai korona, cara ligasi jam 6 kurang teapat, beresiko menusuk glans, utamakan savety pasien ya, saat ngiris preuputium usahakan jangan dipengang menggunakan tangan, manfaatkan clamping sebagai handle.