

FEEDBACK OSCE ANAK Periode MEI 2024 TA 2023/2024

18711122 - MELLY RAHMAWATI

STATION	FEEDBACK
STATION 1	Pilihan resusitasi gunakan makro set, bukan mikro set, banyak udara di selang, kateter infus kurang mentok, alias menjuntai diluar kulit, salah menghitung tpm
STATION 10	pemeriksaan suhu yg bener, 37 sudah subfebris? jangan lupa cuci tangan post, deskripsi UKK belajar lg, edukasi rawat luka nya gimana sblm disalepin,
STATION 11	periksa infeksi kulit. rujuk utk antibiotik injeksi, antihipertensi, atasi edema
STATION 12	Baik
STATION 13	antropometri tidak diperiksa. vital sign tidak diperiksa. nafas cuping hidung tidak diperiksa. titik auskultasi tidak diperhatikan dengan baik.
STATION 2	DD carilah yang mendekati Dx nya, jangan justru yang berlawanan dengan data nya
STATION 3	Baik
STATION 4	anamnesis riw lahir kurang dieksploarasi, ax terkait imunisasi sebelumnya sudah lengkap, penjelasan ttg vaksin yg diberikan lengkap, persiapan oke tapi kurang melihat apakah vaksin masih layak pakai (VVM atau tgl ED) baru ingat di akhir, teknik penyuntikan ok, pasca tindakan hrusnya dibuang kemana? edukasi pasca vaksin ok, pengisian jadwal vaksinasi kurang lengkap (dicek lg di KMs yg baru apa saja utk vaksin PPI)
STATION 5	bagusnya sebelum dilakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh pada pasien anak lakukan pemeriksaan antropometri BB TB/PB KU dan vital sign nadi RR suhu dsb. cb baca lagi panduan MPASI sesuai menu keluarga di buku KIA, teksturnya yg berbeda, edukasi harusnya melingkupi komposisi MPASInya apa saja. kl tdk diberi tahu hanya bilang dikasih bubur nanti bakalan di kasih bubur sumsum n pisang kerok tiap hari. padahal harus lengkap gizi seimbang. bagus lagi kasih contoh menu. saat usia 6 bulan ASI sdh tdk dominan meski begitu tdk berarti langsung diganti sufor. jd tdk perlu khawatir ASI kurang atau tdk sempat menyusui krn sdh mulai makan jgua.
STATION 6	dosis terbagi kurang tepat
STATION 8	Pemeriksaan fisik kurang sistematis. interpretasi penunjang kurang tepat itu bukan leukositosis ya, tetapi leukopeni. Dosis Kloramphenicol 4x250 mg saja untuk berat 24 kg, kalau 500 mg terlalu banyak. Paracetamol dosisnya juga terlalu banyak. Metoklopramid itu sediaannya 1 tablet 10 mg ya. Pemberian bisa 3x110 mg, bukan 3x500 mg.
STATION 9	perhatikan prinsip bersih dan steril saat menyiapkan alat; belum memakai handschoen (baru dipasang di tengah-tengah proses resusitasi;), belum menyalakan lampu; di awal, ambubag tidak perlu disambungkan ambubag; cara memegang ambubag dan sungkup salah; irama VTP salah, belum tekan-lepas-lepas; saat menyiapkan ET, VTP tetap dilanjutkan asisten; memasukkan laringoskop dengan tangan kiri, bukan kanan; ukuran ET salah; banyak belajar dan berlatih