

FEEDBACK REMED 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 6 TA 2023/2024

21711021 - REYHAN GUNAWAN

STATION	FEEDBACK
IPM 10 IMUNISAS	TBC itu menyebabkan scar, jadi dijelaskan bahwa dalam 2-4 minggu pasca tindakan akan muncul bisul yang akan mengering dan meninggalkan scar, juga harus dijelaskan bahwa luka bekas suntikan jangan digosok2 ya Reyhan.
IPM 3 SIRKUMSISI	Baik
IPM 7 KONTRASEPSI (PEMASANGAN IMPLAN KB)	jangan dikeluarkan dari kemasan kalau sudah terpasang di inserter,, kalau mau mamsukan kassa ke liang vagina pakailah pean panjang,
IPM 8 RESUSITASI NEONATUS	persiapan awal :belum lengkap, langkah awal : ok tapi kain basah tdk langsung digantikan, posisi VTP CE-clamps sudah ok, SRIBTA ok, VTP efektif ok, pasang ET terlalu dalam insersinya, VTP kompresi ok, memasukkan epinefrin apa betul pilih UVCnya yg itu? baca lagi cara pengenceran epinefrinnya, pemahaman alur sudah baik, asisten : kompresi iramanya kurang cepat, posisi & kedalaman ok
IPM 9 ANAK	Sudah cukup baik, walaupun beberapa pemeriksaan dan tindakan lupa kemudian diingat dan koreksi dengan baik.